

మాంసపుజాతి కోళ్ళ పెంపకం

మాంసపు జాతి కోళ్ళను “బ్రాయిలర్స్” అంటారు. ఈ జాతి కోళ్ళు అతి త్వరగా పెరిగి, తిన్నమేతను సులువుగా మాంసంగా మారుస్తాయి. బ్రాయిలర్ మాంసం అతి రుచిగాను, మృదువుగాను ఉంటుంది. బ్రాయిలర్ మాంసంలో ఎక్కువ మాంసక్రత్తులు (22-25%), తక్కువ శక్తి (150 కిలో కాలరీలు/100 గ్రా.) ఉంటుంది. బ్రాయిలర్ కోళ్ళు తిన్న మేతను ఎక్కువ భాగం మాంసంగా మార్చి, 6 వారాల్లో 2 కిలోల పైగా బరువు తూగే విధంగా శాస్త్రియంగా రూపొందించబడ్డాయి. వీటి యాజమాన్య పద్ధతులు సాధారణంగా గుడ్ల జాతి వాటీని పోలినప్పటికి, ఇవి కేవలం 5 లేక 6 వారాల వయస్సులో విక్రయించటానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి.

జాతులు మరియు వాటి శ్రీడింగ్ పద్ధతులు : న్యూహంప్షైర్, ప్రైమోత్రాక్ మరియు వైట్ కార్బ్రూష్ జాతులను బ్రాయిలర్ కోళ్ళు ఉత్పత్తికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. వైట్ కార్బ్రూష్ జాతి కోళ్ళకు పెరుగుదల ఎక్కువ మరియు ఉత్తమ శ్రీడి మాంసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. రాక్జాతి కోళ్ళు కూడా అతి తొందరగా తక్కువ కాలంలో పెరుగుతాయి. ఈ రకం కోళ్ళు తిన్న మేతను ఎక్కువ భాగం మాంసంగా మారుస్తాయి.

కమర్సియల్ బ్రాయిలర్స్ ఉత్పత్తికి ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి పరచిన పిత్య మరియు మాతృ వంశాలను వాడాలి. మన దేశంలో కూడా ఈ పద్ధతినే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వెంకాబ్, రాన్, ఇండ్యోబ్, హబ్ చిక్స్, అనక్, లోమాన్ పేర్లతో బ్రాయిలర్ కోళ్ళు మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయి.

కోడి పిల్లల ఎంపిక

తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ బరువు వచ్చేవిగాను, దాణా వినియోగ సామర్థ్యత మరియు జీవ సామర్థ్యత కలిగినటువంటి లక్షణాలున్న బ్రాయిలరు కోడిపిల్లలను ఎంపిక చేయడం మంచిది. ధర ఎక్కువ అయినను మన్నికైన మేలు జాతి కోడి పిల్లలతోనే బ్రాయిలర్ పెంపకం ప్రారంభించాలి. వ్యాపార దృష్ట్యా నడిచే బ్రాయిలర్ కోళ్ళ ఘారాలన్ని సంకరజాతి కోడి పిల్లలతోనే ప్రారంభించాలి. హేచరీల నుండి కొని, అవి 6 వారాల వయసు రాగానే అమ్మ వేయాలి. సంకరజాతి కోళ్ళను సరఫరా చేయు హేచరీల వివరాలు క్రింది పట్టికలో పొందువర్చుబడ్డవి.

హేచరీ	ప్రదేశం	మాంసపు జాతి కోడి పిల్లల పేర్లు
1. వెంకటేశ్వరా హేచరీన్ లిమిటెడ్	ప్రైమరాబాద్	వెంకాబ్
2. డైమండ్ హేచరీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	ప్రైమరాబాద్	వెంకాబ్
3. కసిలా ఘారమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	ప్రైమరాబాద్	హబ్ చిక్స్
4. రాయల్ హేచరీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	ప్రైమరాబాద్	వెంకాబ్
5. జాఫ్స్	ప్రైమరాబాద్	లోమాన్
6. స్నేహ హేచరీన్	ప్రైమరాబాద్	వెంకాబ్
7. శ్రీనివాస హేచరీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	విజయవాడ	వెంకాబ్
8. తిరుమల బ్రిడ్జర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	వరంగల్	వెంకాబ్
9. వి.ఎన్.ఎన్. హేచరీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	చిత్తూరు	వెంకాబ్
10. ఎన్.ఎన్. హేచరీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	స్నేహ ఘనపూర్	వెంకాబ్
11. సుగుణాహచరీన్	ప్రైమరాబాద్	రాన్

గృహవసతి : బ్రాయిలరు షెడ్యూలోనికి స్వచ్ఛమైన గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా ఉండాలి. ప్రతి కోడికి 1.0 చ. అదుగు నేల కావలసి ఉంటుంది. విక్రయ వసతి గల ప్రాంతాల సమీపాన షెడ్యూలు నిర్మించాలి. గృహవసతి, ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి వారానికి ఒక పర్యాయం లేదా రెండు వారాలకొకసారి లేదా నెలకొకసారి కోడిపిల్లలు సరఫరా అయ్యేట్లు, హేచరీన్స్‌తో పిర్మాట్లు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కోళ్ళ పారంలో ఎన్ని జట్లు కోళ్ళ ఉంటాయో అన్ని మరియు ఒకటి అదనంగా షెడ్యూలు నిర్మించుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడూ ఒక షెడ్ ఖాళీగా ఉంటుందన్నమాట. ఖాళీగా ఉండే షెడ్ను తరువాత వచ్చే కోడిపిల్లల జట్టు కొరకు శుభ్రపరచి, బ్రూడరు ఇతర పరికరాలు అమర్చి సిద్ధంగా ఉంచాలి.

యాజమాన్య పద్ధతులు : కోడి పిల్లలు ఉంచవలసిన స్థలాన్ని శుభ్రంగా వేడినీటిలో బట్టల సోడాను కలిపి కడగాలి. మలాధియాన్, సుమార్థాన్ మొదలగు క్రిమి సంపోరక మందులు 25 మి.లీ. 10 లీటర్ల నీళ్ళలో వేసి పిచికారి చేయాలి. పాత స్థలం అయితే భీచింగ్ పొడరు, సున్నుంతో కలిపి వెల్లవేయడం మంచిది. డిసిన్సెక్టెంట్ ద్రావకంతో షెడ్యూలు, పరికరాలను శుభ్ర పరచాలి. ఒక రోజు పిల్లలు హేచరీన్ నుండి సప్లై అయ్యాక, వాటికి కావలసిన వేడి, గాలి, వెలుతురు మరియు గాలిలో తేమ సరిగా ఉండేటట్లు చూడాలి. పిల్లలకు వేడి కలుగజేసేందుకుగాను ఎలక్ట్రికల్ బ్రూడర్లను గాని, గ్యాస్ బ్రూడర్లనుగాని అమర్చాలి. ఏ బ్రూడర్ అయినా బల్బుల వేడి మరియు కాంతి కోడిపిల్లలపై కేంద్రీకృతమయ్యారి చూడాలి. బ్రూడర్స్ లేకున్నా, ఒక ఇస్ట్రారెడ్ బల్బ్ ప్రతి 250 పిల్లలకు అమర్చితే సరిపోతుంది. ఇవి అందుబాటులో లేనప్పుడు మూడు 100 వాట్ బల్బులు అమర్చిన ఎదల 250 కోడి పిల్లలకు సరిపోతుంది. మొదటి వారంలో 35⁰ సెల్వియస్ వెచ్చడనాన్ని ఇవ్వాలి. తరువాత ప్రతి వారం 2.8⁰ సెల్వియస్ తగ్గిస్తూ 4వ వారం వచ్చే సరికి 25⁰ సెల్వియస్ ఉండేట్లు చూడాలి. చలి, ఇతర గాలులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ లేదా బొగ్గుల ద్వారా బ్రూడింగ్ చేయడం మంచిది.

బ్రాయిలరు పెంపకంలో మంచి ఘలింతాలు కలగాలంటే కోళ్ళకు తగినంత మేత, నీటి స్థలాలను కేటాయించాలి.

కోడి పిల్లల వయస్సు	మేత స్థలం	నీటి స్థలం
6 వారాల వరకు	2 అం.	1 అం.
6 వారాల పైబడి	3 అం.	1 అం.

బ్రాయిలర్ కోళ్ళను కేజెన్లో కూడా పెంచడానికి వీలున్నప్పటికి, డీప్ లిట్టరు పద్ధతి ఎక్కువగా వాడుకలో ఉన్నది. కేజెన్లో పెంచిన కోళ్ళ ఛాతిపై కందిపోయిన కురుపులు ఏర్పడి, కాళ్ళు కొంకర్లు తిరిగి, మాంసం దిగుబడి మరియు నాణ్యత తగ్గిపోయే అవకాశమున్నది.

బ్రాయిలరు కోళ్ళ పోషణ : ముఖ్యంగా బ్రాయిలరు కోళ్ళ పెంపకంలో 70-75 శాతం ఖర్చు మేతకి అవుతుంది. ఈ కోళ్ళ పెరుగుదల కూడా ఈ దాణా యొక్క పోషక విలువల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువలన వీటి దాణా గురించి అధిక ప్రధాన పహించాలి. బ్రాయిలరు పెంపకంలో ఎక్కువ లాభాలు గడించాలంటే, మేత ఖర్చు తక్కువయ్యేట్లు చూసుకోవాలి.

బ్రాయిలరు కోళ్ళకు కావలసిన పోషక పదార్థాలన్నింటిని తగు పొళ్ళలో సమకూర్చే కొన్ని దాణా మిశ్రమాల నమూనాలు పట్టికలో ఇవ్వబడినవి. వీటిని రైతులు పొచించవచ్చు. లేదా తమ ప్రాంతంలో తక్కువ ధరకు దొరుకు దినుసులను బట్టి తగు మార్పును చేయవచ్చు. మార్పులు క్రమేషి చేయాలి. దినుసులు ఉత్తమమైన నాణ్యత కలిగి ఉండాలి.

దినుసులు	స్టేట్‌ర్ పోట్ (0-3 వారాలు)			ఫినిషర్ (4వ వారం నుండి)		
మొక్కజొన్సులు (కిలోలు)	35.0	55.0	58	42.0	62.0	65.0
జొన్సులు/సెజ్జులు (కిలోలు)	20.0	-	-	20.0	-	-
సూనె తీసిన సోయా పిండి (కిలోలు)	-	10.0	33.4	-	10.0	24.4
సూనె తీసిన వేరుశనగ పిండి (కిలోలు)	33.2	22.2	-	26.2	15.2	-
సూనె తీసిన ప్రాద్య తిరుగుడు పుష్టి పిండి (కిలోలు)	-	5.0	5.0	-	5.0	7.0
చేప (కిలోలు)	10.0	5.0	-	10.0	5.0	-
డైకాల్వియం ఫాస్ట్ పోట్ (కిలోలు)	1.0	1.6	1.9	1.0	1.6	1.9
సున్నపురాయి పొడి (కిలోలు)	0.6	1.0	1.3	0.6	1.0	1.3
ఉప్పు	-	-	0.25	-	-	0.25
సూక్ష్మలవణాల మిశ్రమం (కిలోలు)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
మెథియోనిన్ (కిలోలు)	0.06	0.06	0.2	0.06	0.06	0.1
విటమిన్ ఎ, బి ₂ , డి ₃ , కె (గ్రాములు)	10	10	10	10	10	10
విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ (గ్రాములు)	10	10	10	10	10	10
విటమిన్ ఇ 50% (గ్రాములు)	2	2	2	2	2	2
కొలిన్ క్లోరెండ్ (గ్రాములు)	100	100	100	100	100	100
కాస్టిపోట్/ప్రైగ్రో (కాస్టిపోట్) (గ్రాములు)	50	50	50	50	50	50

బ్రాయిలర్ కోళ్ళకు ప్రత్యేకంగా తయారుచేయబడిన స్టేటర్ రు, ఫినిషర్ దాణాలనే వాడాలి. మొదటి 3 వారాల వరకు స్టేటర్ దాణా, ఆ తర్వాత ఫినిషర్ దాణాలను ఇవ్వాలి. స్టేటర్ రు దాణాలో మాంసకృతులు 22 శాతం, శక్తి కిలో దాణాకు 2900 కిలో కాలరీలు ఉండాలి ఫినిషర్ దాణాలో మాంసకృతులు 20 శాతం, శక్తి 3000 కిలో కాలరీలు కిలో దాణాకి ఉండేలా దాణాను తయారు చేసుకోవాలి. అప్పుడే బ్రాయిలరు కోళ్ళ పెరుగుదల సరిగా వుంటుంది. లేనిబో మాంసపు దిగుబడి తగ్గపోయే ప్రమాదముంటుంది. బ్రాయిలర్ కోళ్ళ దాణాలో 1 లేదా 3 శాతం వరకు సూనె లేదా కొవ్వును వాడి దాణ వినియోగ సామర్థ్యతను పెంచవచ్చు (1.6 నుండి 1.7).

మేలు జాతి బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లలతో ప్రారంభించి, మంచి పోషణ, యాజమాన్యంతో పెరిగిన కోళ్ళ బరువు, మేత వినియోగ వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి.

వయస్సు	బరువు	మేత ఖర్చు	బరువుగా మేతమార్పిడి
6 వారాలు	1800 గ్రా.	3600 గ్రా.	1.8
7 వారాలు	2200 గ్రా.	4840 గ్రా.	2.0

రోగాలు

ఎస్టోర్పిషియా కొల్లె: బ్రాయిలర్ పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి తీవ్రంగా వస్తుంది. బాక్సీరియా వల్ల కలిగే ఈ వ్యాధితో బ్రాయిలర్లో బరువు సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల నష్టం వాటిల్లతుంది. ఈ వ్యాధి సోకిన కోడి పిల్లలు నీరసంగా ఉండి మేత సరిగా

తినకపోవడం జరుగుతుంది. మరణించిన కోడి పిల్లల ప్రేగులు ఉట్టి ఉంటాయి. యాంటిబయాటిక్స్ మందులు మేతలో మరియు నీటిలో వాడితే ఈ వ్యాధి సోకిన పిల్లలను కాపాడవచ్చు. త్రాగు నీటితో పాటు సేనిటైజర్ మందును కోళ్ళకు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ వ్యాధి రాకుండా నివారించుకొనవచ్చు.

కాక్సీడిమోసిన్ : [ప్రోటోజోవా] వలన సోకే ఈ వ్యాధితో బ్రాయిలర్ పరిశ్రమ తీవ్ర సష్ట్యానికి గురవుతుంది. బ్రాయిలర్ అధిక సంఖ్యలో మరణించడం, రోగం నుంచి కోలుకున్న పిల్లల్లో బరువు సరిగా రాకపోవడం జరుగుతుంది. మేతలో “కాక్సీడిమోసిట్స్” సరిదైన మోతాదుల్లో వాడనపడు గాని, అసలు వాడక పోవడం వలన గాని ఈ వ్యాధి వస్తుంది. 11వ రోజునుండి 8వ వారం లోపల ఎప్పుడైన ఈ వ్యాధి బ్రాయిలర్ పిల్లలకు సోకవచ్చు. రోగం సోకిన పిల్లలు మూలలకు గుమిగూడి సుస్థిగా ఉంటాయి. ఎరువు వర్షం గల రెట్టను చూడవచ్చు. మేత మరియు నీరు తక్కువ తీసుకొంటాయి. మరణించిన పిల్లల ప్రేపులు ఉట్టి రక్తం కలిగి ఉంటాయి. మేతలో మరియు నీటిలో కాక్సీడిమోసిట్స్ మందులు తగు మోతాదులో వాడితే ఈ రోగాన్ని నివారించవచ్చు.

ఇన్ఫెక్షన్ బర్పుల్ డిస్చెంజ్ (గంబోరో రోగం) : ఈ వ్యాధి బిర్మా వైరస్ ద్వారా కలుగుతుంది. బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లలు 1వ వారం నుండి 2 నెలల వయస్సు వరకు ఈ వ్యాధికి ఎక్కువగా గురవుతాయి. వ్యాధి సోకిన కోడి పిల్లలు 10 నుండి 20 శాతం వరకు చనిపోతాయి. నీళ్ళ విరోచనాలు, సరిగా నిలబడక పోవడం, వణుకుట ఈ వ్యాధి లక్షణాలు. చనిపోయిన కోళ్ళ ఛాతి మరియు తొడ కండరాల మీద రక్తపు చారలు మరియు బర్మ గ్రంథి పుటల్లో కూడా చీము మరియు రక్తపు చుక్కలు కనపడతాయి. ఈ వ్యాధి సోకిన కోడి పిల్లలను వెంటనే వేరు చేయడం ముఖ్యం. రోగు కోడి పిల్లలను వేరుచేయడం మరియు యాంటిబయాటిక్స్, విటమిన్లు నీళ్ళలో కలిపి ఇవ్వటం వలన కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ వ్యాధి నివారణకు 10-14 రోజుల్లో ఇంటర్వెడియట్ స్ట్రేన్షన్ టో టీకాలు చేయవచ్చు.

కొక్కర రోగం (రానికెట్ రోగం) : ఈ వ్యాధి వైరస్ క్రిముల ద్వారా కలుగుతుంది. 4-5వ రోజు వయస్సు కోడి పిల్లలకు ఎఫ్-1 ఆర్డి టీకా వేయించాలి. ఈ మందు వ్యాధి నిరోధక శక్తి 6 వారాల తదుపరి క్లీష్టిస్టుంది. అందుచేత బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లలను గుడ్ కోళ్ళ దగ్గరగా పెంచినపడు, 4వ వారంలో రెండవ ఆర్.డి. టీకా వేయించాలి. ఆర్.డి. వ్యాధి సోకిన బ్రాయిలర్ పిల్లలు కుపులుగా మరణిస్తాయి. మెడలు వాల్పుడం, ఆకుపచ్చ వర్షంకల విరోచనాలు, సన్సగా మూలుడం ఈ వ్యాధి లక్షణాలు, వ్యాధి సోకినట్టయితే వెంటనే ఎఫ్-1 ఆర్.డి. టీకా వేయించాలి. సన్సని రక్తపు గడ్డల చుక్కలు జీర్ణాశయ (ప్రోవెంట్రిక్యులన్) లోపలి భాగంలో కనబడతాయి. ప్రేగులోని పొరలు ఎర్రబారటం, గాలి గొట్టల్లో తెపుడ నిండియండటం, శ్వాస సంచులు ఉట్టి పేలగా నుండటం. “సీకా” అను పెద్ద ప్రేగుల జంక్షన్లో రక్తపుచుక్కలు తప్పకుండా ఉండటం మొదలగునవి మిగతా లక్షణాలు. నివారణకు రోగం సోకిన కోళ్ళను వెంటనే వేరు చేయాలి. వేరే ప్యాక్టులను కోళ్ళ పెడ్డలోనికి రానివ్వకూడదు. పెడ్డు చుట్టూ రెండు అడుగుల దూరంలో నున్నం, గమాక్సిన్ పొదరు వేయాలి. ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఫినాయల్ ఉంచాలి. కోళ్ళలో బలాన్ని కలిగించేందుకు ఇతర రోగాలు నివారించేందుకు నీళ్ళలో యాంటిబయాటిక్స్, విటమిన్లు 10 రోజులు వాడాలి.

సి.ఆర్.డి. (క్రానిక్ రెస్పిరేటర్ డిస్చెంజ్) : బ్రాయిలర్ చిన్ పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి తీవ్రంగా వస్తుంది. ముక్కునుండి చీము కారటం, గురక, శ్వాసలో ఇఖ్యంది ఈ రోగ లక్షణాలు. బ్రాయిలర్ పిల్లలు బరువు తగ్గుతాయి. మరణించిన పిల్లల గాలి గొట్టల్లో తెపుడ నిండి యుంటుంది. కాలేయంపై తెల్లని పొర వస్తుంది. యాంటిబయాటిక్స్ మందులు, టయాముటిన్ లేదా ప్రైలాన్ మందులు వాడడం వలన రోగాన్ని వెంటనే నయం చేయవచ్చు.

సి.ఆర్.డి. నివారణ

మందు	నివారణ
ఎ) చీయాముటిన్ (45%)	(1000 బ్రాయిలర్ కోళ్ళకి : నీటిలో)
వయస్సు	
మొదటి వారం	రోజుకి 5 గ్రాములు (3 రోజులు)
8/9 రోజు	రోజుకి 5 గ్రాములు (2 రోజులు)
3వ వారం	రోజుకి 25 గ్రాములు (3 రోజులు)
4వ వారం	రోజుకి 20 గ్రాములు (2 రోజులు) తదుపరి 40 గ్రాములు రోజుకు (3 రోజులు)
5 వ వారం	రోజుకి 55 గ్రాములు (3 రోజులు)
6వ వారం	32 గ్రాములు/రోజుకు (2 రోజులు) తదుపరి 65 గ్రాములు రోజుకు (3 రోజులు)
చి) పైలాన్ సోలుబుల్	
1-3 రోజుల వయస్సు	1 గ్రాము/లీటరు నీటిలో (3-5 రోజులు)
8 రోజుల తర్వాత	1 గ్రాము/లీటరు నీటిలో

కొర్కెజా : కోడి పిల్లలు సరిగా నీటిని, మేత తీసికొనక బరువును కోల్పోతాయి. ముక్కునుండి, కండ్లనుండి నీరు కారుట రోగ లక్షణాలు. కండ్లు ఉభ్య తెల్లని చీము గడ్డలుగా తయారవుతాయి. మరణసంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఒకసారి ఈ వ్యాధి క్రిములు షైఫ్టులోనికి ప్రవేశించిన, అన్ని బ్యాచ్లలకు ఈ రోగం వస్తునే వుంటుంది. ఒక బ్యాచ్లలో ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు కొద్ది రోజులు షైఫ్టు ఖాళీగా పెట్టి, “బ్లోలాంవ్”తో నేల, గోడలను కాల్చాలి. సున్నం, గమాక్సిన్, ఫినాయల్, ఫీచింగ్ పొడర్ కలిపి వెల్లవేయాలి. లిట్టరు ఎల్లప్పుడు పొడిగా ఉండేలా చూడాలి. రోగం సోకిన పిల్లలకు హెహాస్టసెక్సిన్, ప్లాక్స్ టెక్ ఇతర యాంటిబయాటిక్ మందులు విటమిన్స్ కలిపి వారం రోజులు వాడిన ఎడల పూర్తిగా నయమవుతుంది.

బ్రాయిలర్ పెంపకంలో మెళ్ళకువలు

- ప్రతి బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లకు 1 చదరపు అడుగు స్థలం కేటాయించాలి.
- ప్రతి 500 కోళ్ళకు ఒక పాట్టిషన్ చేయాలి.
- రాత్రిశ్ను తప్పకుండా లైట్లు వేయాలి. దీని వలన మేత తినేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
- 2-3 చదరపు అంగుళాల మందంగా లిట్టరు ఉండాలి. అది ఎల్లప్పుడు పొడిగా వుండాలి.
- నీటి తొట్లు, మేతతొట్లు ఎల్లప్పుడూ నిండి ఉండాలి.
- సరిగా పెరగని పిల్లలను వేరుచేసి, మేత, నీరు వేరే ఏర్పాటు చేయాలి.
- బ్రాయిలర్ పిల్లలు స్టోర్టర్ మేత 1.5 కిలోలు తినగానే ఫినిషర్ మేతకు మార్చాలి.
- కాక్సిడియా వ్యాధి నివారణ మందులు మేతలో 6 వారాల వరకు వాడాలి.

బ్రాయిలర్ కోళ్ళకు వాడవలసిన మందులు

1. మొదటి రోజు వాడే మందులు

- ఎ) ఆంటీబియాటిక్ మందులు కోళ్ళవైద్య నిపుణుల సలహామేరకు వాడాలి.
- బి) వైటాబ్లోండ్ లేక రోవిసార్ ఏని ప్రతి 100 పిల్లలకు 2 మి.లీ. చొప్పున 5 రోజులు వాడాలి.

2. వారం రోజుల తర్వాత వాడే మందులు

1. ఎడి ఇసి మందులు ప్రతి 100 పిల్లలకు 2 మి.లీ. చొప్పున నీటిలో కలిపి వాడాలి.
2. బి-కాంప్లెక్స్ 5-10 మి.లీ. ప్రతి 100 పిల్లలకు ఇవ్వాలి.

విక్రయించటం

బ్రాయిలర్ కోళ్ళ త్వరగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి 40 లేక 45 రోజుల్లో విక్రయించడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైన బ్రాయిలర్ కోళ్ళను 45 రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఉంచరాదు. ఆ విధంగా ఉంచినట్లయితే తిన్న దాణాకు అనుగుణంగా ఒరువు పెరగక టైమ్ లు నష్టపోవలసి ఉంటుంది.

బ్రాయిలర్ పెంపకంలో ఆదాయ, వ్యయపట్టిక (1000 బ్రాయిలర్ కోళ్ళకు)

ఎ. ప్రారంభపు పెట్టుబడి (రూపాయలు)

1. కోళ్ళ షెడ్యూలు కావలసిన భూమి 1/4 ఎకరం -----	స్వంత స్థలం
2. కోళ్ళ షెడ్యూలు, 1 చ.ఆ. కోడికి 150 రూపాయల చొప్పున -----	1,50,000.00
3. బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లలు ఒకటి 16,00 రూ. చొప్పున -----	16,000.00
4. కోళ్ళ దాణా 12,00 రూ. కిలో చొప్పున 3.5 కిలోలు 6 వారాల్లో -----	42,000.00
5. పరికరాలు 15.00 రూ.లు కోడికి చొప్పున -----	15,000.00
6. పనివారి జీతం 6 వారాల వరకు రూ. 70/రోజుకు -----	2,940.00
7. వివిధ ఖర్చులు (లిట్టరు, మందులు, కరెంటు మొదలగునవి) కోడికి 5 రూ. చొప్పున -----	5,000.00
ప్రారంభపు పెట్టుబడి -----	2,30,940.00

బి. తదుపరి ప్రతి బ్రాయిలర్ బ్యాచ్ పెంచటానికయ్యే ఖర్చు

1. బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లలు -----	16,000.00
2. కోడిమేత -----	42,000.00
3. వివిధ ఖర్చులు -----	5,000.00
4. డిప్రివియెషన్ షెడ్యూలై 10 శాతం చొప్పున 2 నెలలకు -----	2,500.00
5. డిప్రివియెషన్ పరికరాలపైన, 15 శాతం చొప్పున 2 నెలలకు -----	375.00
6. ప్రారంభపు 2,30,940.00పై వడ్డి, 12 శాతం చొప్పున 2 నెలలకు -----	4,619.00
మొత్తం ఖర్చు 960 బ్రాయిలర్ కోళ్ళ కయ్యే ఖర్చు -----	70,494.00

సి. ఆదాయం

1. బ్రాయిలర్ కోళ్ళ అమృటం వలన రూ. 50 కిలో కోడి చొప్పున $1.7 \times 50 \times 960$ -----	81,600.00
2. లిట్టరు అమృటం వలన ఒక టన్సు (�క టన్సు లిట్టరు రూ. 800 చొప్పున) -----	800.00

3.	గోనె సంచలు అమృటం వలన 8 రూ. ఒక సంచి చొప్పున -----	448.00
	మొత్తం ఆదాయం -----	82,848.00
	ఖర్చు, ఆదాయం పట్టిక	
1.	మొత్తం ఆదాయం -----	82,848.00
2.	మొత్తం ఖర్చు -----	70,494.00
	నికరాదాయం 1000 బ్రాయిలర్డపై -----	12,354.00
	ఒక బ్రాయిలర్ కోడిపై నికరాదాయం -----	12.35

పై ఆదాయం, వ్యయ పట్టిక యందు 5 శాతం బ్రాయిలర్ కోళ్ళు చనిపోయినట్లు భావించబడింది. 2 శాతం బ్రాయిలర్ కోడిపిల్లలు అదనంగా ఇస్తారు. బ్రాయిలర్ ఉత్పత్తి మొత్తం ఖర్చులో దాణా ఖర్చు దాదాపు 75 శాతం పైబడి ఉంటుంది. అందుచేత తక్కువ దాణా తిని ఎక్కువ మాంసం ఉత్పత్తి చేసిన యొడల ఆ కోడి జాతి శ్రేష్ఠమైనదని చెప్పవచ్చు.

పారి