

కొర

రాష్ట్రంలో కొర సాగు విస్తీర్ణం 25 వేల ఎకరాలు. రాష్ట్రంలోని కొర సాగు విస్తీర్ణం దాదాపు 70 శాతం అత్యవ్యాపిత మండలంలోను మిగిలిన 30 శాతం మిగిలిన మండలాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఎకరాకు సరాసరి దిగుబడి 252 కిలోలు.

విత్తే సమయం : ఖరీఫ్ : జూన్-జూలై, వేసవి : జనవరి

నేలలు : తేలిక నుండి నల్లరేగడి నేలలు, మురుగు నీటి పారుదలగల నేలలు

రకాలు

రకం	బుతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్రీ/ఎ)	గుణగణాలు
ప్రసాద్	ఖరీఫ్, వేసవి	70-75	8-12	కంకులు పెద్దగా వుండి గింజలు లావుగా, లేత పసుపు రంగులో వుంటాయి. మొక్కలు 110 సెం.మీ. ఎత్తు పెరిగి ఆకులు వెడల్పుగా ఉండి, 3, 4 పిలకలు వేస్తాయి.
కృష్ణ దేవరాయ	ఖరీఫ్, వేసవి	80-85	10-12	గింజలు లావుగా, లేత పసుపు రంగులో వుంటాయి. మొక్కలు 110 సెం.మీ. ఎత్తు ఎదిగి 4-6 పిలకలు వేస్తాయి. చొప్ప నాణ్యమయినది.
నరసింహరాయ	ఖరీఫ్ వేసవి	80-85	10-12	గింజలు లావుగా, పసుపురంగులో వుంటాయి. మొక్కలు 110-120 సెం.మీ. ఎత్తు ఎదిగి బాగా పిలకలు వేస్తాయి.
శీలజీ	ఖరీఫ్ వేసవి	80-85	10-12	మొక్కలు 120 సెం.మీ. ఎత్తు పెరిగి, వెరికంకి, తుప్ప మరియు అగ్గితెగుళ్ళను కొంత వరకు తట్టుకొంటాయి.

విత్తనం : ఎకరాకు 2 కిలోలు

విత్తటం : విత్తనాన్ని వరసల మధ్య 22.5 మరియు మొక్కల మధ్య 7.5 సెం.మీ. దూరంలో గొర్రుతో విత్తుకోవాలి. ఎకరాకు 2 లక్షల 37 వేల మొక్కలు ఉండాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేసి ఆఖరి ఢుకిల్లో కలియ దున్నాలి. ఎకరాకు 8 కిలోల నత్తజని, 8 కిలోల భాస్వరం విత్తేటపుడు వేయాలి. నాచిన 3-4 వారాల తర్వాత పైపాటుగా మరో 8 కిలోల నత్తజనిని వేసుకోవాలి.

అంతరపంటలు : కొర : కంది / వేరుశనగ / సోయాచిక్కుడు - 5:1, కొర : వేరుశనగ - 2:1

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : విత్తిన రెండు వారాలలోపుగా ఒత్తు మొక్కలను తీసివేయాలి. విత్తిన 30 రోజుల వరకు పంట పొలంలో కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూడాలి.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

గులాబీ రంగు పురుగు : లార్యాలు మొవ్వును తోలిచి తినడం వలన మొవ్వు చనిపోతుంది. ఫూత దశలో ఆశించినట్లయితే వెన్నులు తెల్ల కంకులుగా మారుతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 1.6 మి.లీ. మొనోక్రోటోఫాన్ కలిసి పిచికారీ చేయాలి.

చెదలు : కొర వేర్లను, భూమిలో ఉన్న చెదలు ఆశించటంవలన మొక్కలు వాడి చనిపోతాయి. వీటి నివారణకు చివరి దుక్కిలో ఫాలిడార్ 2 శాతం పొడిమందును ఎకరాకు 10-12 కిలోల వంతున మట్టిలో బాగా కలిసేట్లు వేయాలి.

మిడతలు : ఇవి పైరు మొలకెత్తినప్పటి నుంచి ఆకుల అంచులను కొరికి నష్టం కలిగిస్తాయి. వీటి నివారణకు కార్బరిల్ 5 శాతం పొడి మందును ఎకరాకు 10-12 కిలోల చొప్పున చల్లాలి.

కాండం తొలుచు పురుగు : ఈ పురుగు కాండాన్ని తొలచటంవలన మొక్కలు సరిగా ఎదగక చనిపోతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. ఎండోసల్వాన్ కలిపి రెండుసార్లు 20-30 రోజుల మధ్య పిచికారి చేయాలి.

ఆర్ట్రీవర్న్ : దీని లడ్డె పురుగులు మొక్కలు పెరిగే దశలో ఆకులను, వెన్నులను కొరికి తినివేస్తాయి. దీని నివారణకు క్లోరిప్రెసిఫాన్ లేదా ఎండోసల్వాన్నను లీటరు నీటిలో 2 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

తుప్పుతెగులు : ఈ తెగులు ఒక రకమైన శిలీంద్రం వలన కలుగుతుంది. ఆకుల మీద రెండుపైపులా గోధుమ రంగు కలిగిన చిన్నచిన్న ఉప్పుత్తు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చలు ఆకుతోడిమ మరియు కాండం మీద కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చలు ఎక్కువ అయిన ఎదల ఆకులు ఎండిపోతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ కలిపి పైరుపై తెగులు కనిపించిన వెంటనే పిచికారి చేయాలి.

అగ్గితెగులు : ఎదిగిన మొక్కల ఆకులపై నూలు కండె ఆకారంలో మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఆకులు అంతటా వ్యాపించి ఆకులు ఎండి రాలి పోతాయి. కంకికాడపై మచ్చలు ఏర్పడినపుడు కాండం విరిగి, కంకిలో తాలు గింజలు ఏర్పడతాయి. దీని నివారణకు కాప్టాన్ లేక ఛైరమ్ (3 గ్రా/కిలో) విత్తనాలకు కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. లీటరు నీటికి కార్బూండజిమ్ 1 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. వారం రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

పెప్రికంకి తెగులు : తేమతో కూడిన వాతావరణంలో ఆకుల అడుగువైపున బూజు లాంటి శిలీంద్రం పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అట్టి ఆకులు ఎండి పీలికలుగా కనిపిస్తాయి. మొవ్వులోని ఆకులు సరిగా విచ్చుకోవ. మొక్క నుండి బయటకు వచ్చిన కంకులు గింజల ప్రదేశంలో ఆకుపచ్చని ఆకుల మాదిరిగా మారి కనిపిస్తాయి. దీని నివారణకు 3 గ్రా. ఛైరమ్ లేక కాప్టాన్ లేక మెటలాక్సీల్ కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయాలి లేదా లీటరు నీటికి మెటలాక్సీల్ 1 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. కలిపి పంటపై పిచికారి చేయాలి.

సస్యరక్షణతో మంచి ఘలితాలు పొందాలంటే, ఒక ఎకరాకు 200 లీటర్ల నీటితో సిఫార్సు చేయబడిన మొత్తాదులో సిఫార్సు చేయబడిన క్రిమినాశక/శిలీంద్రనాశక మందులను కలిపిన ద్రారణాన్ని పిచికారి చేయవలసివుంటుంది.

కొర పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రిన్సిపల్ పైంటీస్ (చిరుధాన్యాలు), వ్యవసాయ పరిశోధనా సాంస్కరిక పరిషత్తు - 517 505, చిత్తురు జిల్లా ఫోన్ నెం. (0877)-2276240, సెల్ నెం. 9989625227