

రాగి / త్రైదలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాగి 1.13 లక్షల ఎకరాల్లో సాగుచేయబడుతూ 49 వేల టన్లుల ఉత్పత్తి నిస్తుంది. సరాసరి దిగుబడి ఎకరాకు 4.35 క్షీంటాళ్ళు వస్తుంది.

విత్తేసమయం : రాగిని ఖరీఫ్‌లో జూలై-ఆగష్టు మాసాల్లో, రబీలో నవంబరు-డిసెంబరు మాసాల్లో, వేసవిలో జనవరి-ఫిబ్రవరి మాసాల్లో విత్తుకోవచ్చు.

నేలలు : రాగిని తేలిక రకం ఇసుక నేలలయందు మరియు బరువు నేలల్లో పండించవచ్చు. నీరు నిల్వాటండే భూములు అనువైనవికావు.

రకాలు

రకం	బుతువు	పంటకాలం (రోజూల్లో)	దిగుబడి (క్షీ/ఎ)	గుణగణాలు		
				1	2	
గోదావరి	ఖరీఫ్, రబీ	120-125	12-16	అన్ని బుతువుల్లో పండించవచ్చు, పైరు ఎక్కువగా పిలకలు వేస్తుంది. మొక్క పచ్చగా ఉండి, వెన్నులు పెద్దగా, ముద్దగా ఉంటాయి. గింజలు ఎరువు గోధుమ రంగు కలిగి, మధ్యస్థ మైన లావుంటాయి.	3	4
రత్నగిరి	ఖరీఫ్, వేసవి	110-115	12-16	పైరు ఎక్కువగా పిలకలు వేస్తుంది. మొక్క ఆకుపచ్చగా ఉండి 90 సె.మీ. ఎత్తువరకు ఎదుగుతుంది. వెన్నులు పెద్దగా ముద్దగా ఉంటాయి. గింజలు ఎరువు గోధుమ రంగులో ఉండి, మధ్యస్థమైన లావుగా వుంటాయి.	5	
సహగిరి	ఖరీఫ్, రబీ	110-115	12-16	పైరువెత్తుగా పెరిగి, పిలకలు ఎక్కువగా వేస్తుంది. చిత్తరూ జిల్లాకు అనుకూలం.	3	4
మారుతి	ఖరీఫ్, వేసవి	85-90	10-12	బెట్టను, అగ్గి తెగులును అన్ని దశల్లోను తట్టుకొంటుంది.	5	
చంపావతి	అన్ని కాలాలకు	80-85	10-12	రాగి పండించే అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. బెట్టను తట్టు కొంటుంది. అంతర పంటగా కందితో పండించేందుకు అనువైనది.	3	4
భారతి	అన్ని కాలాలకు	105-110	14-16	అన్ని బుతువులలో పండించవచ్చు. వెన్నులు పెద్దగా ముద్దగా ఉంటాయి. అగ్గి తెగులును కొంత వరకు తట్టుకోగలదు.	3	4
తీచ్చెతన్య	ఖరీఫ్	110-115	12-16	పైరు ఎత్తుగా పెరిగి పిలకలు ఎక్కువగా వేస్తుంది. ఖరీఫ్‌లో అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది.	5	

విత్తనం : 2.5 కిలోల విత్తనంతో 5 సెంట్లో పెంచిన నారు ఎకరా పొలంలో నాటడానికి సరిపోతుంది. వెడజల్లే పద్ధతిలో ఎకరాకు 3-4 కిలోల విత్తనం కావాలి.

విత్తన శుద్ధి : కిలో విత్తనాన్ని 2 గ్రా. కార్బూండైజిమ్ లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్స్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

విత్తటం : తేలిక పాటి దుక్కిచేసి విత్తనం చల్లి, పట్టె తోలాలి. నారుపోసి నాటుకోవాలి. మురుగు నీటిపారుదల సౌకర్యంగల నేలల్లో నారుపోసుకోవాలి.

నాటటం : 85-90 రోజుల స్వల్పకాలిక రకాలకు 21 రోజుల వయసుక్కిన మొక్కలను, 105-125 రోజుల దీర్ఘకాలిక రకాలకు 30 రోజుల వయసు క్షీన మొక్కలను నాటుకోవాలి. ఎకరాకు దీర్ఘకాలిక రకాలకు లక్ష ముచ్చు మూడు వేల మొక్కలు, స్వల్పకాలిక రకాలకు రెండు లక్షల అరవై ఆరువేల మొక్కలు ఉంచాలి.

విత్తే దూరం : స్వల్పకాలిక రకాలకు వరుసల మధ్య 15 సెం.మీ., వరుసలో 10 సెం.మీ., దీర్ఘకాలిక రకాలకు వరుసల మధ్య 15-20 సెం.మీ. వరుసలో 15 సెం.మీ. దూరం పాటించి విత్తుకోవాలి.

ఎరువులు

నారుమధిలో : 5 సెంట్లు నారుమధి ఎకరాకు సరిపోయే నారును ఇస్తుంది. 640 గ్రాముల నత్రజని, 640 గ్రాముల భాస్వరం మరియు 480 గ్రాముల పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులను వేయాల్సి ఉంటుంది.

పొలంలో : ఎకరాకు 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేసి ఆఫరి దుక్కిలో కలియడున్నాలి. ఎకరాకు 12 కిలోల నత్రజని, 12 కిలోల భాస్వరం, 8 కిలోల పొటాష్ నాటేటపుడు వేయాలి. నాటిన 30 రోజులకు మరో 12 కిలోల నత్రజనిని పైపాటుగా వేసుకోవాలి.

విత్తనం వెడజల్లే పద్ధతి : బాగా మెత్తగా తయారైన భూమిలో విత్తనాన్ని సమానంగా చల్లుకోవాలి. విత్తనం చల్లిన తరువాత బల్లతోగాని, చెట్టుకొమ్మతోగాని, నేలను చదును చేయాలి. లేనిచో విత్తనానికి తగినంత తేమ లబించక మొలక శాతం తగ్గుతుంది.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : విత్తిన రెండు వారాల లోపుగా ఒత్తు మొక్కలను తీసివేయాలి. విత్తనం వేసేదానికి మరియు నారు నాటటానికి ముందు పెండిమిథాలిన్ 30% ఎకరాకు 600 మి.లీ. వేసేదానికి చొప్పున 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసి కలుపును నివారించవచ్చు. నాటిన 25, 30 రోజులకు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కల నిర్మాలనకు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2,4 డి సోడియం సాల్ట్ 80% పొడిమందు 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : నాటిన పైరు బాగా వేర్లు తొడిగిన తర్వాత 10 రోజులు నీరు పెట్టరాదు. పూత, గింజ పాలు పోసుకునే దశల్లో పైరు నీటి ఎద్దడికి గురికాకుండా చూడాలి.

అంతర పంటలు : రాగితో కందిని 8:2 నిష్టత్తిలో సాగుచేయవచ్చు. దీనిలో రాగి వరుసల మధ్య దూరం 30 సెం.మీ., మొక్కల మధ్యదూరం 10 సెం.మీ. కంది వరుసల మధ్యదూరం 60 సెం.మీ., మొక్కల మధ్యదూరం 20 సెం.మీ. పాటించాలి. రాగితో చిక్కుడును 8:1 నిష్టత్తిలో వేసుకోవచ్చు. వరుసల మధ్యదూరం 30 సెం.మీ. వరుసల్లో రాగి మొక్కల మధ్యదూరం 10 సెం.మీ. మరియు చిక్కుడు మొక్కల మధ్యదూరం 20 సెం.మీ. పాటించాలి.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

గులాబి రంగు పురుగు : ఈ పురుగు సజ్జ, జొన్సు, కొర్ పంటలను కూడ ఆశిస్తుంది. . బాగా ఎదిగిన లార్మ్సులు లేత గులాబి రంగులో ఉంటాయి. లార్మ్సులు కాండాన్ని తొలచి సారంగాలు చేసి లోపలి భాగాలను తినడం వలన మొప్పు చనిపోతుంది. పంటను కంకి దశలో ఆశిస్తే అవి తెల్ల కంకులుగా మారుతాయి. ఈ లార్మ్ పురుగులు ఒక మొక్క నుంచి యింకొక మొక్కకు పొకి సష్టపరుస్తాయి.

దీని నివారణకు ఈ పురుగు ఆశించిన మొక్కలను గుర్తించి ఏరివేయాలి. మొక్కల అవశేషాలను కాల్చివేయడం ద్వారా వీటివల్ల కలిగే నష్టం తగ్గుతుంది. అవసరాన్ని బట్టి ఒకటి, రెండు శాతం మొక్కల్లో పురుగు ఆశించినప్పుడు లీటరు నీటికి ఎండోసల్వాన్ 2 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

శనగ పచ్చ పురుగు : ఇది రాగి పంటని కంకి దశలో ఆశించి పూత, గింజలను తిని నష్టపరుస్తుంది. నివారణకు పురుగు ఆశించినప్పుడు కంకులను దులిపి లేదా చేతితో ఏరివేసి నాశనం చేయాలి. లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. ఎండోసల్వాన్ లేదా 3 గ్రా. కార్బూరిల్ 50 శాతం పొడి మందు కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఎకరాకి 8 కిలోల వంతున మలాధియాన్ 5% పొడి మందు కంకులపై చల్లికూడ నివారించ వచ్చును.

చెదలు : రాగి, కొర్ పంటలను చెదలు ఎక్కువగా ఆశించి నష్టపరుస్తాయి. తేలిక నేలల్లో, వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఈ పంటను పండించినప్పుడు చెదలు ఎక్కువ నష్టం కలుగజేస్తాయి. వీటి నివారణకు పంటల చుట్టూ అక్కడక్కడ ఎత్తుగా కనిపించే పుట్టును నాశనం చేయాలి. ఆ పుట్టుల పై భాగంలో రంధ్రం చేసి లీటరు నీటికి 5 మి.లీ. చొప్పున క్లోరిప్రెరిఫాన్ మందును కలిపి ఒక్కాక్క పుట్టులో 10-12 లీటర్ల మందు ద్రావణం పోయడం ద్వారా చెదలను నివారించవచ్చు. ఈ చెదలు ఎక్కువగా నష్టపరిచే ప్రాంతాల్లో పంటలు వేసే ముందు ఆఖరి దుక్కిలో లిండేన్ పొడి మందును ఎకరాకు 10 కిలోల చొప్పున భూమిపై చల్లి కలియడున్నాలి.

తెగుళ్ళు

అగ్గితెగులు : ఈ తెగులు నారుమడిలోను, తరువాత నాటిన పంటను ఆశిస్తుంది. వర్షపు జల్లులు పడుతూ గాలిలో అధిక తేమ ఉండి, రాత్రి ఉష్ణీగ్రతలు 20 డిగ్రీల సెల్వియన్సుకు చేరుకున్నప్పుడు అగ్గితెగులు ఉర్ధుతి ఎక్కువవుతుంది. వాతావరణం ఈ విధంగా ఉంటే అధిక నృత్యజని వాడిన పంటల్లో తెగులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఎదిగిన మొక్కల ఆకులు, కణపులు, వెన్నులపైన దారపుకండ ఆకారంలో మచ్చలు విరుద్ధతాయి. ఈ మచ్చలు చుట్టూ ఎన్నపు గోధుమరంగు అంచులు కలిగి ఉంటాయి. కణపులపై తెగులు ఆశిస్తే కణపులు విరగడం, వెన్నుపై ఆశిస్తే గింజలు తాలు గింజలుగా మారుతాయి. దీని నివారణకు పంట పొలాల్లో కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూడాలి. ముందు జ్ఞాగ్రత్త చర్యగా విత్తనపుద్ది చేసి విత్తుకోవాలి. తెగులును తట్టుకొనే రత్నగిరి, శ్రీచెత్తన్య, భారతి రకాలను ఎన్నుకోవాలి. మొక్కలపై అక్కడక్కడ మచ్చలు కనిపించినప్పుడు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బూరండైజిమ్ లేదా 1 మి.లీ. ఎదిఘెన్ఫోన్ఫాన్ మందు కలిపి పిచికారి చేయాలి. నృత్యజని ఎరువులను సిఫారసుకు మించి వాడకూడదు. నారునాటీ ముందు షైటాన్క్ లేదా మాంకోజెబ్ మందును 3 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి అ ప్రావణంలో నారును ముంచి శుద్ధి చేసి నాటుకుంటే పంటను మొదటి దశల్లో ఆశించే తెగుళ్ నుండి కాపాడుకోవచ్చు. వెదజల్లి విత్తేపద్ధతిలో 3 గ్రా. ద్రైరమ్ లేదా కాప్టాన్ కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయాలి.

ఆకుమాడుతెగులు : లేత మొక్కల వేర్లు, మొదళ్ళపై తెగులు ఆశించి మొక్కలు కుళ్ళిపోతాయి. ఆకులపై చిన్న అండాకారపు లేత గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి తర్వాత ఆకులు ఎండుతాయి. దీని నివారణకు మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పైరుపై పిచికారి చేయాలి.

సస్యరక్షణతో మంచి ఫలితాలు పొందాలంటే, ఒక ఎకరకు 200 లీటర్ల నీటితో సిషార్పు చేయబడిన మోతాదులో క్రిమినాశక/ శిలీంద్రసాశక మందులను కలిపిన ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయవలసి వుంటుంది.

పంటకోతు : రాగి పంటను సరైన సమయంలో కోతను ప్రారంభించాలి. గింజలు ముదురు గోధుమ రంగులో ఉన్నప్పుడు, వెన్నుకు దగ్గరి ఆకులు పండినట్లుగా ఉన్నప్పుడు పంటను కోయువచ్చు. పిలక కంకుల కంటే ప్రథాన కాండపు కంకి మొదట కోతకు వస్తుంది. కాబట్టి 2 లేక 3 దశల్లో కంకులను కోయాలి. పొలంలోనే చొప్పును కోసి 2-3 రోజులు ఆరిన తరువాత వెన్నులను విడదియువచ్చు లేదా నేరుగా చొప్పును కోయుకుండ వెన్నులనే కోసి 2-3 రోజులు పొలంలో ఆరబెట్టువచ్చు. బాగా ఆరిన వెన్నులను కర్రలతో కొట్టిగాని, ట్రాక్టరు నడపడం ద్వారా గాని గింజలను సేకరించాలి. అలా సేకరించిన గింజలను గాలికి తూర్పురబెట్టి నాళ్యమైన గింజలను పొందవచ్చు.

రాగి పంటసాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా “ప్రైవీపల్ సైంటిస్ట్(చిరుధాన్యాలు),
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, పెరుమాళ్ పల్లె - 517 505,
ఫోన్ నెం. (077)-2276240, నేల్ నెం. 9989625227

లేదా

ప్రైవీపల్ సైంటిస్ట్ (బ్రీడింగ్) & హాడ్, వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానం, విజయనగరం - 535 001
ఫోన్ నెం. 08922-225983

- O -