

గ్లాడియోలన్

గ్లాడియోలన్ పూలను కట్టఫవర్గా, అందమైన పూగుచ్చాలు తయారుచేయడంలో పుపయోగిస్తారు. దీనికి సమశీల్పించు వాతావరణం అనుకూలం.

నేలలు : తేలికపాటి నేలలు అనుకూలం. కనీసం 30 సె.మీ.లోతుగల ఒండ్రు నేలలు. ఉదజని సూచిక 5.5-6.5 మధ్యగల ఎక్కువ సేంద్రీయ పదార్థం గల గుల్లబారిన భూముల్లో పూలు అధికంగా వస్తాయి.

రకాలు : ఎల్లోప్రిల్, సదాబహర్, ఆల్ఫ్రెడియాన్, సిల్వ్రొ, అరుణ్, కాజల్ వంటి వివిధ రంగుల పూల రకాలను వేయవచ్చు.

ప్రవర్ధనం : దుంపల(కార్పు) ద్వారా ప్రవర్ధనం చేస్తారు. దుంపలను తవ్వి తీసిన మూడు నెలల వరకు నిద్రావస్థ వుంటుంది. 4 సె.మీ. వ్యాసం గల దుంపలని నాటుకొన్నట్టుతే పెద్ద పూల కాడలు వస్తాయి. దుంపలు చిన్నగా వున్నట్టుతే పూలకాడలు చిన్నగా వుంటాయి. ఇంకా చిన్నగా వున్నట్టుతే పూల కాడలు ఏర్పడవు.

నాటుటం : జూన్ నుండి డిసెంబరు వరకు నాటుకోవచ్చు. నాటుటానికి ముందు దుంపలపై వుండే గోధుమ రంగు పొలుసులను తొలగించడం గడ్డలని లీటరు నీటికి 2గ్రా.ల కాప్టాన్ కలిపిన ద్రావణంలో 15-30 నిమిషాలుంచి నాటుకోవాలి. పూల సరఫరా కాలాన్ని పెంచటానికి ప్రతి 15 రోజుల నుండి నెల రోజుల వ్యవధిలో దుంపలను నాటుకోవడం వలన మంచి మార్కెట్సు పొందవచ్చు.

నాటేధూరం: దుంపలను 30x20 సె.మీ. దూరంలో ఎకరానికి ఘమారు 55 నుంచి 60 వేల దుంపలను నాటుకోవాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 10ట. పశువుల ఎరువుతోపాటు 120-140 కిలోల నత్రజని, 80 కిలోల భాస్వరం, 80 కిలోల పొటువ్వినిచ్చే ఎరువులను వేయాలి.

నీటియాజమాన్యం : వాతావరణ, భూమి పరిస్థితులననుసరించి 7-10 రోజుల వ్యవధితో నీటి తుఫలు యివ్వాలి. పూల కడలు ఏర్పడే సమయంలో నీటి ఎద్దడి వుండకూడదు.

అంతరకృషి : మొక్కలు పడిపోకుండ మట్టిన ఎగదోయాలి. పూత సమయంలో ఊతమివ్వాలి.

కత్తిరించటం : పూల కాడ మొదటి పుష్పపు రంగు కనబడిన వెంటనే పూల కాడను నాలుగో ఆకు వరకు కత్తిరించి వెంటనే కత్తిరించిన కాడ మొదలు నీటిలో వుంచాలి.

దిగుబడి : ఎకరాకు 36,000 నుండి 40,000 పూల కాడలను పొందవచ్చు.

సస్యరక్షణ

ప్యాజెరియమ్ రాట్ : దీనివల్ల ఆకులు వంకర తిరిగి, విల్లులా వంగి, కురచబడి, పసుపు రంగుకు మారి ఎండిపోవతాయి. అంతేకాకుండా నిలువచేసినపుడు పొలంలో దుంపలు కుళ్చిపోవటం జరుగుతుంది. నివారణకు నాటేముందు పొలుసులు తీసిన దుంపలను కాప్టాన్ 2గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపిన ద్రావణంలో దాదాపు 25-30 ని॥ ముంచి తీసి నాటుకోవాలి.

ఆకుముడత(త్రిప్పు) : ఇవి పుష్పాలను పుష్పరక్షోపత్రాలను ఆశిస్తాయి. దీని మూలంగా తెల్లటిచార లేర్పుడతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి మోనోఫోలోఫాన్ 1.5 మి.లీ. లేదా మలాధియాన్ 2 మి.లీ. లేదా డైమీథోయెట్ 2మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేసి నివారించుకోవచ్చు.