

## బీటరూట్

బీటరూట్ను పచ్చగా, సలాడ్గా తింటారు. కూరగాను, పచ్చక్క తయారీలోను వాడుతారు. అంతేకాక క్యానింగ్ చేయటానికి అనుమతి లేదా లేత బీటరూట్ ఆకులను ఆకుకూరగా వాడుతారు.

**నేలలు :** లోతైన, సారవంతమైన యిసుక నేలలు అనుమతి లేదా లేత బీటరూట్ ఆకులను ఆకుకూరగా వాడుతారు. 6-7గల ఉదజని సూచిక అనుకూలం. అధిక క్షారత గల చొడు భూములలో కూడా పెంచవచ్చు.

**వాతావరణం :** శీతాకాలపు పంట  $18^{\circ}$  నుండి  $21^{\circ}$  సెల్చియన్ ఉప్పొగ్రత అనుకూలం.

**విత్తనమోతాదు :** బీటరూట్ విత్తనాలను ‘సీడ్ బాల్స్’ అంటారు. ఒక్కోదానిలో రెండు కంటే ఎక్కువ విత్తనాలుంటాయి. ఎకరాకు 3-4 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది.

**విత్తే విధానం :** వరుసల మధ్య  $45$  సెం.మీ. వరుసలలోని మొక్కల మధ్య  $8-10$  సెం.మీ. దూరం ఉండేటట్లు విత్తుకోవాలి.

**విత్తే సమయం :** ఆగష్ట నుండి నవంబరు చివరి వరకు విత్తుకోవచ్చు. దఫదఫాలుగా ఒక్కొక్క దఫాకు 15 రోజుల తేదాతో విత్తుకుంటే మార్పు డిమాండ్కు అనుగుణంగా పంట పొందవచ్చు).

### రకాలు

**డెట్రాయిడ్ డార్కోరెడ్ :** పంట కాలం:  $80-100$  రోజులు. అధిక ఇగుబడినిచ్చే రకం. గడ్డ పైపార బాగా ఎర్రగా ఉంటుంది.

**క్రిమ్సన్ గ్లోబ్ :** గడ్డ గుండ్రంగా ఉండి, పై పొర లేత ఎరువు రంగుతో ఉంటుంది. పంటకాలం  $90-95$  రోజులు. అధిక దిగుబడినిస్తుంది.

**ఎల్లీ వండర్ :** గడ్డ ఎర్రగా ఉంటుంది. పంటకాలం:  $55-60$  రోజులు.

**నేల తయారీ మరియు విత్తుటి :** నేలను అదును వచ్చే వరకు బాగా దున్నాలి. ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరాకు  $10-12$  టన్నుల పశువుల ఎరువును వేసి కలియ దున్నాలి. బీటరూట్ విత్తనాలను ‘సీడ్ బాల్స్’ అంటారు. ఒక్కోదానిలో రెండు కంటే ఎక్కువ విత్తనాలుంటాయి. ఎకరాకు 3-4 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. వరుసల మధ్య  $45$  సెం.మీ., వరుసలలో మొక్క మొక్కకీ మధ్య  $8-10$  సెం.మీ. దూరం ఉండేటట్లు విత్తుకోవాలి.

**ఎరువులు :** ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరాకు  $14$  కిలోల నుత్రజని,  $44$  కిలోల భాస్వరం,  $14$  కిలోల పొట్టావ్ వేసుకోవాలి. గింజ విత్తిన  $25$  రోజులకు ఎకరాకు  $14$  కిలోల నుత్రజని,  $14$  కిలోల పొట్టావ్ వేసుకోవాలి.

**అంతరక్షిణి :** బీటరూట్ సాగులో, గింజలు మొలకెత్తిన తర్వాత, ఒక్కో గింజ బాల్ నుండి  $2-6$  మొలకలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒక బలమైన మొలక ఉంచి, మిగిలినవి హీకి వేయాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇలా కనీసం రెండుసార్లు చేసి, ఒక్కో మొక్క మధ్య  $10$  సెం.మీ. దూరం ఉండేటట్లు చేయాలి. గింజ మొలకెత్తిన  $20-25$  రోజుల తర్వాత కలుపు తీసి, మన్మ ఎగదోయాలి. దీని పలన గడ్డ బాగా ఊరుతుంది.

**సస్యరక్షణ :** పొముపొడ(ఆకుతొలుచు పురుగు), ఆకుతినే పురుగులు సాధారణంగా ఆశిస్తాయి. లీటరు నీటికి మలాధియాన్ లేదా డ్రైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. కలిపి పిచికారీ చేసి ఆకు తొలుచు పురుగును నిపారించవచ్చు. ఆకుతినే పురుగుల నివారణకు లీటరు నీటికి డైక్లోరోవాన్ 2 మి.లీ. లేదా కార్బరిల్ 3గ్రా. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

మొక్క కుక్కు తెగులు, బూజు తెగులు, బీట్ పసుపుపచ్చ తెగుళ్ళు ఆశిస్తాయి. వీటి నివారణకు కిలో విత్తనానికి ఛైరం లేదా కాప్టాన్ 2గ్రా. పట్టించి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. పంటపై 2గ్రా. డైఫేన్ జడ్-78లీ. నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

**కోత, దిగుబడి :** 60-90 రోజుల్లో పంట తయారవుతుంది. మొక్క మొత్తం గడ్డతో సహ ఏకి, ఆకుల తీసివేసి కడిగి మార్చెట్కి పంపాలి. ఎకరాకు 10-12 టన్నులు దిగుబడిని పొందవచ్చు.

బీట్రూట్ సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా **251వ పేజీలో** ఇవ్వబడింది.

---