

చెదలు - నివారణ

చెదలు ముఖ్యంగా కొయ్య సామూగ్రినే గాక, వివిధ పంటలను, పలు చెట్లను ఆశించి చెట్లు లోపలి మెత్తబీ భాగాన్ని తినేస్తాయి. ఈ పురుగు యొక్క బెడద చెల్చా మరియు ఎరుమట్టి నేలల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పురుగులు సామూహికంగా పుట్టల్లో నివశిస్తాయి. ఇవి ముఖ్యంగా 4 తెగలు. 1) రాణి 2) రాజు 3) పనిచేసే చెదపురుగులు (సేవకులు) 4) సైనిక చెద పురుగులు. రాణి మరియు రాజు పురుగులు మొదట రెక్కలు కలిగి వుంటాయి. ఈ రెక్కల పురుగులు తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే పుట్టనుండి బయటకు వచ్చి నేలమీదకానీ, గాలిలోగాని సంపర్కం జరుపుకొంటాయి. సంపర్కం జరిగిన తరువాత పురుగుల రెక్కలు రాలిపోతాయి. రెక్కలు రాలిన రాణి పురుగు భూమిలోనికి పోతుంది. ఆ తర్వాత రాణి పురుగు పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా మారి గ్రుడ్లు పెట్టడం మొదలు పెడుతుంది. బాగా అభివృద్ధి చెందిన రాణి పురుగు ఒక రోజులో మమారుగా 30,000-80,000 గ్రుడ్లు పెడుతుంది. ఈ విధంగా అవసరాన్ని బట్టి 7-10 సం||ల వరకు గ్రుడ్లు పెడుతుంది. గ్రుడ్ల నుండి పిల్ల పురుగులు 1 నెల నుండి 3 నెలల లోపు బయటకొస్తాయి. పిల్ల పురుగులు పెద్ద పురుగులుగా మారటానికి సంవత్సరకాలం పడుతుంది. పనిచేసే చెదపురుగులు తెల్లగా లేక గోధుమ వర్డం కలిగి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. సైనిక పురుగులు, పనిచేసే పురుగులకంటే పెద్దవిగా ఉండి రెక్కలు లేకుండా ఉంటాయి.

నష్టపరిచే విధానం : పనిచేసే పురుగులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పంట పొలాలను ఆశించి మొక్కల కాండంలోనికి పోయి లోపలి పదార్థాన్ని తింటాయి. అలా తినటం వలన ఏర్పడిన భాళీ ప్రదేశాలను మట్టితో నింపుతాయి. దీనివలన మొక్కలు మొదట వడలిపోయి తరువాత ఎండిపోయి, చనిపోతాయి. మొక్కలను పీకితే సునాయాసంగా ఊడొస్తాయి. పండ్ల మరియు అడవి జాతుల మొక్కల బెరదును తింటూ మట్టితో కప్పేస్తాయి. ఆశించిన చెట్లు గిడసబారిపోతాయి. ఈ పురుగులు ఆశించిన నారుమట్లు వడలి చనిపోతాయి. పీటి ఉధృతి మెట్ట పంటల్లో మరియు నీటి ఎద్దడి ఉన్న పండ్లతోటల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది.

నివారణ : పంటపొలాల గట్టపైన లేక పొలం చుట్టూ ఉన్న చెదపుట్టలను పూర్తిగా త్రచ్చి రాణి పురుగును వెలికి తీసి చంపాలి. 5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాన్ 50 ఇ.సి. మందును లీటరు నీటికి కలిపి సుమారు 15-30 లీటర్ల మందు ద్రావణాన్ని చెదపుట్టల్లో బాగా తడిచేటట్లు పోయాలి.

వేరుశనగలో పీటి నివారణకు కిలో వేరుశనగ విత్తనాన్ని 6.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాన్ మందుతో విత్తన శుద్ధి చేసి, నీడలో ఆరబెట్టి మరుసటిరోజు విత్తాలి.

చెరకులో పీటి నివారణకు చెరకు గడలను మలాధియాన్ (లీటరు నీటికి 2.0 మి.లీ. మోతాదులో కలిపిన) ద్రావణంలో 15 నిమిషాలుంచిన తరువాత నాటాలి.

పండ్లతోటల నారుమచులను తయారు చేసేటప్పుడు లిండేను, మిక్రోల్ పెరాథియాన్ లేదా మరేదైనా పొడిమందు నారుమచుల్లో కలపాలి. చెట్లు నాటే గుంతల్లో కూడా ఏడైనా పొడిమందును గుంతకు 100 గ్రా. మోతాదులో కలపాలి. పొలిథిన్ సంచులలో మొక్కలను పెంచునప్పుడు ఆ సంచులలో పోయు మట్టి మిశ్రమానికి కూడా పైన చెప్పబడిన మందులను ఒక ఘనపుటదుగుమట్టి మిశ్రమానికి ఒక కిలో మందు కలిపి సంచులలో నింపి విత్తాలి. హూల వృక్షాల మొదళకు చెదలు ఆశించునప్పుడు చెద మట్టి దోరలను 15 రోజులకు ఒకసారి గోనె పట్లతో రాల్చిపటయును తర్వాత క్లోరిపైరిఫాన్ 50 శాతం 5 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి చెట్లు చుట్టూ మట్టిని కదిలించి పోయిపటయును.

చెదలు వాటి నివారణపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాలిన చిరునామా : “ప్రొఫెసర్ & పోడిస్ (ఎంటమాలజి), వ్యవసాయ కళాశాల, రాజేంద్రసగర్, హైదరాబాద్ - 500 030”

ఫోన్ నెం. 040-24015011, ఎక్స్ప్రెస్స్ - 377