

ఉలవలు

మన రాష్ట్రంలో ఖరీఫ్ లో మొదటి పంట తరువాత, వర్షాధారంగా లేదా ఏ పంటలు వేయడానికి అనువుగా లేనప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ పంటగా ఉలవలు సాగుచేయవచ్చు. ఖరీఫ్ లో వేరుశనగ, నువ్వులు, గోగు, మెట్టవరి తరువాత ఏక పంటగాను, రాగి, జొన్న పంటల్లో సహ పంటగాను వేయవచ్చు.

పంటకాలం : సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్ : నేలలు : చల్కా ఎర్ర, నల్లరేగడి నేలలు అనుకూలం, మురుగు నీరు నిలువ ఉండే నేలలు పనికి రావు.

రకాలు

రకం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి/ఎ)	లక్షణాలు
పి.డి. యం -1	105	6-6.5	గింజలు బూడిద తెలుపు రంగులో ఉంటాయి.
పి.జెడ్. యం-1	90-95	6-6.5	గింజలు నలుపురంగులో ఉంటాయి.
పి.హెచ్.జి.- 62	85	6-6.5	గింజలు నలుపురంగులో ఉంటాయి.
పి.హెచ్.జి -9	90-100	6	గింజలు బూడిద తెలుపు రంగులో ఉంటాయి. పల్లకు తెగులును తట్టుకొంటుంది.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 1గ్రా. కార్బండజిమ్ మందు చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

నేలతయారీ : ఖరీఫ్ లో మొదటి పంట కోసిన తరువాత తగినంత తేమ చూసుకొని, భూమిని నాగలితో ఒకసారి, గోర్రుతో రెండు సార్లు మెత్తగా దున్ని తయారు చేసుకోవాలి.

విత్తనం, విత్తేదూరం : గొర్రుతో వరుసలలో విత్తే పద్ధతిలో ఎకరాకు 8-10 కిలోలు, వెదజల్లే పద్ధతిలో 12-15 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. దూరం పాటించాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 4 కిలోల నత్రజని, 10 కిలోల భాస్వరం, 8 కిలోల పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులను ఆఖరి దుక్కిలో విత్తే ముందు వేసుకోవాలి.

అంతరకృషి : విత్తిన 25-30 రోజుల మధ్య నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు, గొప్పు చేసి కలుపు నివారణ చేసుకోవాలి.

సస్యరక్షణ : కాయతొలుచు పురుగు : పూత మరియు పిందె ఏర్పడే సమయంలో, పంటకు నష్టం కలుగజేస్తుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి ఎండోసల్ఫాన్ 2 మిల్లీ లీటర్ల చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

బూడిద తెగులు : వాతావరణంలో అధిక తేమ ఉండి, రాత్రి, పగటి ఉష్ణోగ్రతలలో ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండజిమ్ చొప్పున కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. తెగులు ఉధృతంగా ఉన్న ఎడల 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండోసారి కూడ పిచికారి చేసుకోవాలి.

ఉలవల సాగు పై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా : 'ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ (ఫ్రీడింగ్), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, విజయనగరం - 535 001. ఫోన్ నెం. : 08922- 225983

బిఆర్