

కామ్మాక్కి కసువు (సిటోనెల్లా)

ఇది బహు వార్షిక సుగంధతైల గడ్డిమొక్క మమారు 2 1/2 నుండి 3 1/2 అడుగుల ఎత్తువరకు పెరుగుతుంది. దీని తైలం సబ్బులు, అగర్జత్తి, డియోడరెంట్లు, దోమల మందుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

నేలలు : ఈ పంట సాగుకు తేలికపాటి ఎర నేలలు మరియు చల్చి భూములు శ్రేష్ఠమైనవి. అధిక సేంద్రియ పదార్థములు కలిగిన ఇసుక, గరప నేలలు సాగుకు అనుకూలం.

సాగుకు అనువైన ప్రాంతాలు : వర్షప్రాతం సంవత్సరం పొడవునా సమానంగా కురిసే ఎత్తున ప్రాంతాల్లో వర్షాఫారంగా సాగు చేయవచ్చు. నీటి పారుదల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో సాగుచేయవచ్చు.

నాటే సమయం, నాటే దూరం, మొక్కల సంఖ్య : ఆరోగ్యమైన దుబ్బు నుండి తీసిన పిలక మొక్కల ద్వారా ఈ గడ్డిని సాగుచేయవచ్చు. పిలకలను సంవత్సరం పొడవునా నాటు వేయవచ్చు అయితే శీతాకాలం మాత్రం అంత అనుకూలం కాదు. ఎందుకంటే చలి వల్ల మొక్క పెరుగుదల బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. తొలకరి వర్షాకాలం పిలకలు నాటటానికి చాల శ్రేష్ఠమైన సమయం. సాధారణంగా జూలై-ఆగష్టు మాసాలు ఈ పంట నాటటానికి అనుకూలమైనవి. వరుసల మధ్య 60 సెం.మీ., పిలకల మధ్య 45 సెం.మీ. ఉండేటట్లు మళ్ళీగాని, బోదెలపై గాని నాటి, మట్టిని గట్టిగా నొక్కి వెంటనే నీరు పెట్టాలి. ఒక ఎకరాలో నాటటానికి ఘమారు 15,000 పిలకలు అవసరం.

రకాలు : జావా - 2, బయో-13, మంజాప మరియు మందాకిని.

ఎరువులు : ఎకరాకు ఆఖరి దుక్కిలో 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు, 40 కిలోల యూరియా, 100 కిలోల సూపర్ ఫాస్ట్ మరియు 40 కిలోల మూర్ఖేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేసుకోవాలి. ప్రతి కోత తరువాత ఎకరాకు 40 కిలోల యూరియా రెండు దఫాలుగా (కోసిన వెంటనే మరియు 30-45 రోజుల తర్వాత) వేసుకోవాలి.

నీటి యాజమాన్యం : నీటి పారుదల కింద ఈ పంటను సాగు చేసినప్పుడు పిలకలు నాటిన వెంటనే నీరు పెట్టాలి. వర్షాలు సరిగా కురియనప్పుడు మొదటి 45 రోజుల వరకు అనగా పిలకలు నాటుకునేటంత వరకు ప్రతి 3 రోజుల కొకసారి నీటి తడులివ్వాలి. పిలకలు నాటుకున్న తర్వాత నేల స్వభావాన్ని మరియు వాతావరణాన్ని బట్టి నీటి తడులివ్వాలి.

అంతరక్కిషి మరియు అంతరపంటలు : నిమ్మగడ్డిలో పేర్కొన్న విధంగానే ఆచరించాలి.

స్వృష్టిక్షణ : కామ్మాక్కి కసువు పంటను స్టేప్చరోఫోరా ప్ర్యాసిబేసిల్స్ అనే పురుగు ఆశించి నష్టాన్ని కలుగ చేస్తుంది. ఈ పురుగు ఆశించిన మొక్కల లోపలి ఆకులమైన ముడతలు ఏర్పడతాయి మరియు ఆకులు పూర్తిగా తెరచుకోవు. ఈ పురుగు నివారణకు మోనోక్రోటోఫోన్ 1.6 మి.లీ. మందును లీటరు నీటికి కలిపి నాటిన ఒక నేల తర్వాత పంటపై పిచికారి చేయాలి. తడుపరి, పంట కోసిన ప్రతిసారి ఈ క్రిమిసంహారక మందును పిచికారి చేసుకోవాలి లేదా ఎకరాకు 3 కిలోల ఫోరేట్ గుళికలను వేసుకోవాలి. చనిపోయిన దుబ్బులను తీసివేసి నాశనం చేయాలి.

పంటకోత : మొదటికోత, పిలకలు నాటిన రె-6 మాసాల తర్వాత వస్తుంది. తడుపరి పంటకోతలను 2-3 మాసాల కొకసారి తీసుకోవచ్చు. పంటను నేల నుండి 20-25 సెం.మీ. వదిలి కోత కోయాలి. దాదాపు 4-5 సంవత్సరాల వరకు కోతలను లాభదాయకంగా తీసుకోవచ్చు. ప్రతి కోత తర్వాత చనిపోయిన మరియు ఎందిన ఆకులను, పిలకలను తీసివేయాలి. దీనివల్ల కొత్తగా వచ్చే పిలకలు ఆరోగ్యవంతంగా పెరుగుతాయి.

నూనె తీసే పద్ధతి : డిస్టిలేషన్ పద్ధతి ద్వారా కోసిన తాజా ఆకులను యంత్రంలో వేసి నూనెను కండెన్సర్ పద్ధతి ద్వారా వేరుపర్చాలి. తర్వాత శుఫ్రపర్చి గాజు లేక అల్యామినియం దబ్బాల్లో భద్రపర్చాలి. ఒక టన్ను గడ్డి నుండి దాదాపు 8-10 కిలోల తైలం లభిస్తుంది.

ఆదాయం : కామ్మాక్కి కసువు పంటనుండి ఎకరాకు ఘమారు 100 కిలోల నూనె మరియు రూ. 14,000-16,000 వరకు నికరాదాయం లభిస్తుంది.